

Avertissements

agricoles



BULLETIN TECHNIQUE N° 21 DU 16 AOUT 1990

BETTERAVE : Début d'installation de l'oïdium

SITUATION :

Rouille : lente progression

Ramulariose : situation saine

Oïdium : début d'apparition de la maladie dans les secteurs maritimes : cas signalés dans les régions de Montreuil et d'Ardres. Les brouillards locaux du matin semblent avoir favorisé le développement du champignon.

PRECONISATION :

1er cas

Vous n'avez pas encore réalisé d'intervention fongicide :
REALISER, DES QUE POSSIBLE, UN TRAITEMENT FONGICIDE,
quelle que soit la date d'arrachage

Produits conseillés :

ALTO BS	2 kg/ha)	
GEYSER	0,5 l/ha)	
IMPACT	1 l/ha)	cf bulletin n° 19
PUNCH C	0,5 l/ha)	
PENNSUC	1 l/ha)	

2e cas Vous avez déjà appliqué un soufre :
—> intervenir avec un produit polyvalent à longue rémanence
15 jours après le dernier traitement.

3e cas Vous avez déjà effectué un traitement avec un produit polyvalent, NE REALISER UN TRAITEMENT QUE DANS LES CAS SUIVANTS :

P 244



MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE LA FORÊT
Cité Administrative - 59000 LILLE - Tél. 03.20.27.27
STATION RÉGIONALE - Avertissements agricoles - Laboratoire
rue Bernard Palissy - 59000 LILLE - Tél. 03.20.27.27

Abonnement
annuel :
à l'ordre
Régisseur de Recettes
D.R.A.P. Nord-Pas-de-Calais
ISSN 0752-7912 - CPPAP n° 1863 AD

*** Arrachage précoce :**

Si récolte dans plus de 45 j et traitement effectué avant 20 juillet
—> intervenir dès que possible.

*** Arrachage tardif :**

Si traitement réalisé avant le 1er août —> intervenir entre le 20 et le 30 août,

si traitement réalisé entre le 1er et le 10 août —> un 2e traitement sera sans doute envisagé début septembre pour les arrachages au delà du 20 octobre, selon l'évolution des maladies.